

AlgoMelProact

PRODUCT SHEET
AlgoMel Proact 13.02.18 ES V3

Fertilizante órgano-mineral líquido enriquecido con extractos de algas verdes y rojas (Ulva lactuca y Solieria spp.)

Composición garantizada	Valores típicos (% p/p)
Materia seca de Algas	20.0
Boro soluble en agua (B)	0.3
Cobre soluble en agua (Cu)	0.8
Manganeso soluble en agua (Mn)	0.6
Zinc soluble en agua (Zn)	0.6
Ácido mono silícico Si(OH) ₄	0.5

Características físicas	
Aspecto externo	Líquido marrón
pH	2.4
Densidad	1.1g/cm ³

Información general

La aplicación foliar de AlgoMel PROACT estimula los procesos metabólicos dentro de la planta logrando una mejor transición del crecimiento vegetativo al reproductivo. Ofrece las mejores condiciones nutricionales para una floración y un llenado de grano más uniforme. Además, incrementa el tamaño, peso y calidad de los granos cosechados. Incluye polisacáridos sulfatados marinos, que son quelantes naturales provenientes de las algas marinas. Contiene silicio que ayuda en el transporte y regula la distribución de los microelementos actuando como un portador de señales bioquímicas en las plantas bajo condiciones de estrés.

Aplicación

Calibre su equipo antes de la aplicación. Para optimizar resultados, llenar $\frac{3}{4}$ partes del tanque con agua, añadir poco a poco AlgoMel PROACT usando el agitador y complementar el resto del contenedor con agua. Verificar que el pH de la solución esté entre 5.5 y 6.5. Si fuese necesario usar un corrector de pH. En caso de usar agua de baja temperatura, añadir lentamente el producto y agitar la solución antes de aplicarlo. Neutralizar con un producto alcalino. Limpiar el material con agua o con un detergente después de su uso. No utilizar disolventes.

Cultivos	Momento de aplicación	Dosis
Cacahuete, Jícama, Amaranto, Cártamo, Lino, Girasol, Colza, Alfalfa, Col, Col de bruselas, Espinaca, Soya, Alcachofa, Ebo, Ajonjolí, Arroz, Avena, Cebada maltera, Lenteja, Maíz, Sorgo, Trigo, Triticale.	15-20 días antes de la floración	0.6 - 1 (L/ha)
Aguacate, Algodón, Arándano, Cacao, Café, Durazno, Frambuesa, Fresa, Guayaba, Higo, Mango, Manzana, Palma de aceite, Papa, Papaya, Pera, Piña, Plátano, Zarzamora, Uva.	Inicio de la floración (amarre y cuajado de fruto)	2 (L/ha)
Berenjena, Brócoli, Calabacita, Caña de azúcar, Chicharo, Chile, Coliflor, Frijol, Garbanzo, Haba, Jitomate, Melón, Pepino, Sandía, Tomate verde.	Inicio de la floración Maduración de fruto y grano	1 (L/ha)
Cultivos ornamentales (Crisantemos, Gerbera, Rosas y Tulipanes).	5 - 10 días durante la etapa de la floración	250 (ml/ha)

Recomendaciones

Usar material de protección individual necesario: guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
No transporte el producto ni lo almacene junto a alimentos y ropa.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
No ingiera este producto y evite su contacto con ojos y piel.
En caso de presentar molestias por el contacto con el producto consulte a su médico.



AlgoMel^{PROACT}

Medidas de protección al ambiente

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las Buenas Prácticas Agrícolas.

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos

Compatibilidad

AlgoMel^{PROACT} es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Aunque el orden en el que se realice la mezcla de AlgoMel^{PROACT} no es primordial, recomendamos agregar AlgoMel^{PROACT} al final, pero antes de añadir surfactantes o tensioactivos al tanque de mezcla. Es recomendable un test de compatibilidad si la combinación no ha sido usada antes. No mezclar con fertilizantes ácidos fuertes ni productos cálcicos.

Presentación

Envase de 5L y 1L.

Caducidad

24 meses después de su elaboración

Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa.

Las recomendaciones de aplicación generales mencionadas aquí deberán ajustarse a las circunstancias locales, tales como el clima, el método de aplicación y las necesidades de vegetación. Le sugerimos que se contacte con su consultor local para determinar la justa dosificación y frecuencia. El usuario deberá verificar la capacidad del producto en las circunstancias que reinan localmente.