

Oceamax

PRODUCTSHEET
AlgoMe! Push 13.02.18 ES.V2

Fertilizante órgano-mineral líquido enriquecido con extractos de algas rojas (*Solieria spp.*)

Composición garantizada	Valores típicos (% p/p)
Materia seca de Algas	5.0
Nitrógeno total	3.5
Nitrógeno orgánico	1.1
Nitrógeno ureico	2.4
Sulfato de potasio (K ₂ O)	4.3
Trióxido de azufre (SO ₃)	3.4

Características físicas	
Aspecto externo	Líquido
pH	3.7
Densidad	1.12

Información general

La aplicación foliar de Oceamax se realiza durante cualquier periodo de estrés que sufra la planta y en los periodos claves de la fisiología vegetal: enraizamiento, crecimiento, floración y cuajado. Incluye polisacáridos sulfatados marinos, que son quelantes naturales provenientes de algas marinas que potencializan la absorción de los otros elementos.

Aplicación

Calibre su equipo antes de la aplicación. Para optimizar resultados, llenar $\frac{3}{4}$ partes del tanque con agua, añadir poco a poco Oceamax usando el agitador y complementar el resto del contenedor con agua. Verificar que el pH de la solución esté entre 5.5 y 6.5. Si fuese necesario usar un corrector de pH. En caso de usar agua de baja temperatura, añadir lentamente el producto y agitar la solución antes de aplicarlo. Neutralizar con un producto alcalino. Limpiar el material con agua o con un detergente después de su uso. No utilizar disolventes.

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Cereales	2 L/ha	Después del ahijado
Papa	3 L/ha	Inicio de la tuberización
Chicharo, Haba, Garbanzo y Lenteja	2-3 L/ha	Durante la inducción floral
Tabaco, Cebolla, Ajo, Poro, Espinaca y Zanahoria	2 L/ha	3-4 hojas verdaderas
Algodón	2 L/ha	Durante la inducción floral
Plátano, Melón y Sandía	3L/ha	Durante la inducción floral y el cuajado de los frutos
Girasol, Colza, Soya, Col, Coliflor, Brócoli, Alcachofa y Lechuga	2-3 L/ha	3-4 hojas verdaderas
Jitomate, Pimiento, Berenjena y Berries (Fresa, Zarzamora, Frambuesas y Arándanos).	3L/ha	Durante la inducción floral y el cuajado de los frutos
Espárrago	3L/ha	Cuando aparezcan los nuevos tallos
Vid, Frutales y Cultivos perenes	3-4L/ha	Durante la inducción floral y el cuajado de los frutos
Alfalfa, Raygrass, Césped y otros pastos	4L/ha	Después de cualquier periodo de estrés
Viveros Agrícolas y Ornamentales	4L/ha	Cuando las plántulas tengan 3-4 hojas verdaderas y durante la inducción floral.

Uso en la aplicación foliar y fertirriego.

Recomendaciones

Usar material de protección individual necesario: guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.

No transporte este producto ni lo almacene junto a alimentos o ropa.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.

No ingiera este producto y evite su contacto con ojos y piel.

En caso de presentar molestias por el contacto con el producto consulte a su médico.



Oceamax

PRODUCTSHEET
AlgoMei Push 13.02.18 ES.V2

Medidas para protección al ambiente

Respete las recomendaciones de uso del producto
Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad
Respete las Buenas Prácticas Agrícolas

Primeros auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos

Compatibilidad

Presentación

Envase de 5L y 1L

Caducidad

24 meses después de su elaboración

Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa.



Las recomendaciones de aplicación generales mencionadas aquí deberán ajustarse a las circunstancias locales, tales como el clima, el método de aplicación y las necesidades de vegetación. Le sugerimos que se contacte con su consultor local para determinar la justa dosificación y frecuencia. El usuario deberá verificar la capacidad del producto en las circunstancias que reinan localmente.